PHARMACIE BÉCHIEAU

ANSM - Mis à jour le : 08/02/2024

**Dénomination du médicament**

# DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose
## Solution de péroxyde d'hydrogène à 3 pour cent

**Encadré**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**


1. Qu'est-ce que DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
3. Comment utiliser DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.


### 1. QU'EST-CE QUE DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique AUTRES ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS, code ATC : D08AX01.

DOSOXYGENEE 10 VOLUMES est un antiseptique local à usage externe (pour la peau). Il est indiqué :

- pour le nettoyage à visée antiseptique de la peau érodée et de petites plaies.

- pour les saignements des petites plaies superficielles.

Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants, ils réduisent temporairement le nombre des microorganismes.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

**N'utilisez jamais DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose :**

- **En application sur les yeux.**

- Pour nettoyer la peau avant un prélèvement (ponction), une injection ou une intervention chirurgicale.

- **Ne pas utiliser pour désinfecter le matériel médico-chirurgical.**

**Avertissements et précautions**

**Faites attention avec DOSOXYGENEE 10 volumes, solution pour application cutanée en récipient unidose:**

Ne pas avaler.

Ne pas injecter.

Vous ne devez pas utiliser DOSOXYGENEE 10 volumes, solution pour application cutanée en récipient unidose:

- Sur une grande surface de la peau, sur une peau lésée (notamment brulée), une peau de prématuré ou de nourrisson.

- Sur une muqueuse, en particulier génitales.

- Ne pas utiliser pour irriguer des cavités closes ou semi-closes, ni sur des plaies très vascularisées ou sous pansement occlusif. Ce produit doit être utilisé dans le strict respect de ses indications.

Le récipient unidose, après ouverture, doit être utilisé en une seule fois et jeté immédiatement.

**Enfants et adolescents**

Sans objet.

**Autres médicaments et DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose**

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants car il y a un risque que l'association de plusieurs antiseptiques soit incompatible ou alors les rendent inefficaces.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose avec des aliments et de l’alcool**

Sans objet.

**Grossesse et fertilité**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose contient de l’Acide phosphorique, du Pyrophosphate de sodium, du Salicylate de sodium, du Stannate de sodium et de l’Eau purifiée.

Sans objet.

## 3. COMMENT UTILISER DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

**Posologie**

Appliquer DOSOXYGENEE 10 VOLUMES pour:

- nettoyer la peau lésée et les petites plaies,
- arrêtez un saignement léger de plaies superficielles.

**Mode d'administration**

Voie cutanée.

Ne pas avaler, ni injecter.

Une fois que vous avez appliqué la solution, jetez le récipient unidose. Ne gardez pas un récipient unidose pour une utilisation ultérieure.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Si vous avez utilisé plus de DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose que vous n’auriez dû**

Sans objet.

**Si vous oubliez d’utiliser DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d’utiliser DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose**

Sans objet.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des sensations de picotements sur les plaies peuvent survenir. Ceci est sans conséquence et ne doit pas faire modifier le traitement.

Des cas d'embolie gazeuse (formation de bulles d'air dans les vaisseaux sanguins) d'évolution parfois fatale ont été rapportés.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: https://signalement.social-sante.gouv.fr/

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière.

A utiliser immédiatement après ouverture.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose

- La substance active est :

Solution de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent (m/m)

1 volume de solution de peroxyde d'hydrogène à 3 pour cent correspond à environ 10 fois son volume d'oxygène.

- Les autres excipients sont :

acide phosphorique, pyrophosphate de sodium, salicylate de sodium, stannate de sodium, eau purifiée.

### Qu'est-ce que DOSOXYGENEE 10 VOLUMES, solution pour application cutanée en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur

Solution pour application cutanée, flacon de 5, 10, 15, 45 ou 100 ml.

Flacon de 5 ml: boîte de 8, 16, 32, 10, 20 et 40 récipients unidoses

Flacon de 10 ml: boîte de 8, 16, et 32 récipients unidoses.

Flacon de 15 ml: boîte de 16, et 32 récipients unidoses.

Flacon de 45 ml: boîte de 1, et 30 récipients unidoses.

Flacon de 100 ml: boîte de 1, et 30 récipients unidoses.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

## Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

**GIFRER BARBEZAT**
10 AVENUE DES CANUTS
69120 VAULX-EN-VELIN

## Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

**GIFRER BARBEZAT**
10 AVENUE DES CANUTS
69120 VAULX-EN-VELIN

## Fabricant

**GIFRER BARBEZAT**
10 AVENUE DES CANUTS
69120 VAULX-EN-VELIN

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

A compléter ultérieurement par le titulaire.

## Autres

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’ANSM (France).